

特別投稿③

以下情報はそれぞれ
のワクチンを作る会社が行った治験の情報です。ワクチンはすでに世界中で接種が始まっており、その情報は随時更新されています。また両者のワクチンは95%の予防効果が認められています。

「ファイザー・バイオ」部位の痛み、「全身性副反応」には38度以上の発熱、疲労、頭痛、悪寒、嘔吐、下痢、筋肉痛、関節痛があげられています。

このワクチンに対象年齢16歳以上。21日間隔で2回投与します。注射方法は筋肉注射です。卵や防腐剤・ラテックスは混入していません。他のmRNAワクチンでアレルギーを起こした方、1回目を接種してアレルギー反応を起こした方、ポリエチレングリコールアレルギーがある方は接種し

ないように説明されています。ワクチンの副作用は18歳までの「若者群」や副作用を調べるときは「注射部の痛み」のよう「二重盲検法」といって、ワクチンが入った注射とよく8割以上で起こってワクチンが入っていない注射をランダムで投与し、そのための接種された副反応はワクチン接種とは関係ない（ワクチン

「若者群」ではおおよそ8割以上で起こってワクチンが入っていない注射をランダムで投与し、そのための接種された副反応はワクチン接種とは関係ない（ワクチン

「若者群」ではおおよそ8割以上で起こってワクチンが入っていない注射をランダムで投与し、そのための接種された副反応はワクチン接種とは関係ない（ワクチン

「若者群」ではおおよそ8割以上で起こってワクチンが入っていない注射をランダムで投与し、そのための接種された副反応はワクチン接種とは関係ない（ワクチン

「若者群」ではおおよそ8割以上で起こってワクチンが入っていない注射をランダムで投与し、そのための接種された副反応はワクチン接種とは関係ない（ワクチン

新型コロナウイルスワクチンの具体的な副反応について

宮古地区医師会情報部 奥平中心寛

このワクチンに対象年齢16歳以上。21日間隔で2回投与します。注射方法は筋肉注射です。卵や防腐剤・ラテックスは混入していません。他のmRNAワクチンでアレルギーを起こした方、1回目を接種してアレルギー反応を起こした方、ポリエチレングリコールアレルギーがある方は接種し

副反応	1回目の接種		2回目の接種	
	ワクチンを投与	偽薬を投与	ワクチンを投与	偽薬を投与
38度以上の発熱	3.7%	0.9%	15.8%	0.5%
疲労	47.4%	33.4%	59.4%	22.8%
頭痛	41.9%	33.7%	51.7%	24.1%
悪寒	14.0%	6.4%	35.1%	3.8%
筋肉痛	21.3%	10.8%	37.3%	8.2%
関節痛	11.0%	6.0%	21.9%	5.2%

副反応	1回目の接種		2回目の接種	
	ワクチンを投与	偽薬を投与	ワクチンを投与	偽薬を投与
38度以上の発熱	1.4%	0.4%	10.8%	0.2%
疲労	34.1%	22.6%	50.5%	16.6%
頭痛	25.2%	18.1%	39.0%	13.9%
悪寒	6.3%	3.2%	22.7%	2.8%
筋肉痛	13.9%	8.3%	28.7%	5.3%
関節痛	8.6%	6.1%	18.9%	3.7%

副反応	1回目の接種		2回目の接種	
	ワクチンを投与	偽薬を投与	ワクチンを投与	偽薬を投与
発赤	4.5%	1.1%	6.9%	0.7%
腫れ	5.8%	0.8%	8.3%	0.2%
痛み	83.1%	14.0%	77.8%	11.7%

副反応	1回目の接種		2回目の接種	
	ワクチンを投与	偽薬を投与	ワクチンを投与	偽薬を投与
発赤	4.7%	1.1%	7.2%	0.7%
腫れ	6.6%	1.2%	7.5%	0.7%
痛み	71.1%	9.3%	66.1%	7.7%

「若者群」ではおおよそ8割以上で起こってワクチンが入っていない注射をランダムで投与し、そのための接種された副反応はワクチン接種とは関係ない（ワクチン